## ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ!





## ЭФФЕКТИВНО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИШЕМИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ НАИМЕНЬШЕМ РИСКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ<sup>1,2</sup>



Признан Orange Book FDA и Минздравом РФ как эквивалентная замена оригинального клопидогрела<sup>3,4</sup>



Плагрил<sup>5</sup> — 5 лет препарат выбора среди клопидогрелей в России<sup>5</sup>



Доказанная терапевтическая эквивалентность и доверие врачей в 21 стране мира<sup>6,7</sup>



Современная система модифицированного высвобождения<sup>8</sup>



Обеспечивает продление жизни пациентов за счет лучшей приверженности к фиксированным комбинациям<sup>9</sup>



Удобный и понятный прием 1 раз в сутки<sup>8</sup>





Клопидогрел



ПЛАГРИЛ<sup>®</sup> И ПЛАГРИЛ<sup>®</sup> А

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ



## Плагрил Плагрил<sup>®</sup> А

## РАДИ СЕМЬИ, РАДИ СЕБЯ

1.1. Cuisset et al. TOPIC. Eur Heart J. 2017 Nov 1;38(41):3070-3078. 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Плагрил\* от 05.02.2018. 3. Комитет по контролю над лекарственными средствами и продуктами питании. США www.acessdata.fda.gov/scripts/der/oib/search\_products\_cfm/Дата обращения 10.11.2020.
4. https://www.garantur/products/por/prime/doc/7577916/fere/wiew.
5. Согласно данным IMS 2015-2020 гг в улаховках в розниченом канале. 6. Мазур Н.А., Помоновов А.А., Золозова Е.А., Асистина Е.В., Читинева В.В., Возможност и коррекции высокой остаточной реактивности ромобщитов на тералии реактивности ромобщитов на терали реактивности ромобщитов и терали деактивности реактивности ректоричения объективности реактивности реактивности реактивности ректоричения объективности ректоричения объективности ректоричения объективности ректоричения объективности реактивности реактивности реактивности ректоричения объективности реклагительности реклаг заключение о соответствии производ GMP-00637/18/IN, №GMP-00033/16/IN

Плагрия\* Регистрационный комер; ЛСР-00521/99. Меж дукародное меатентование к наименование: кполидогрел, Лехарственная форма: таблетих, покрытые пленочной оболочеой, 75 мг.
Показания для применения: Вторинная профилактика аткроториоботических осповнений у взрослых пациентов с инфарктом множарай (д равностью от некольных двий до 35 дней) и именическного той дена до бежспера и муста данностие осторы корманизации и инфарктом и контражного и техностирование при уческожном и можарай об воторыемое сегмента 5Т (нестаблывая стенокардия или инфаркт имокарай без этубца О), включая пациентов, которым было проведено стентирование при уческожном коронарном мешенательстве (в комбинации с ацентисальных стенокардия или инфаркт имокарай без этубца О), включая пациентов, которым было проведено тромболизиса (в комбинации с ацентисальных пеционовой экслогой). Предотпращение аткроториоботических и тромболизиса (в комбинации с ацентисальных предсерай инфарктивной учественный распражной предсерай инфарктивной учественный учественный предсерай инфарктивность и комбинации и ацентисальных предсерай инфарктивность и учественный и предсерай инфарктивность и истабляющей предсерай инфарктивность и учественным предсерай инфарктивность и учественным пециональным и инфарктивность и учественным и инфарктивность и учественным предсерай инфарктивность и учественным предсерай инфарктивность и учественным и инфарктивность и учественным предсерам и инфарктивность и учественным предсерай инфарктивность и учественным предсерам и инфарктивность и инфарктивность и учественным предсерам и инф нагрузочном дозь, составляющем э00 мг. в затем продолжено приевом поддерживающем дозы 7.5 мг. один раз в сутки (в сочетания с А.К. в дозах 75-32 мг. в сутки). Поскольку применение более выскомы, до А.К. с вазах с учетием и сутки (в сочетания с А.К. в дозах 75-32 мг. один с учетием с пределять п дами деятельности. Условия отпуска: Отпускают по рецепту.

видами деятельности. Условия отпуска Отпуска от пораценту.

"Полная мефорамция представленая в инструкции по меряцинскому применению СИП от 1.11.2019 г. на основания ИМП от 50.02.2018 г.

Патрим\* А Регистрационный менер. ПП-03331. Международное непатевтованием или группировечие назавите защетил сальный представления формах как путь обращения представления у пациентов, которые уже получают орновнения орновнения орновнения орновнения у пациентов, которые уже получают орновнения орновнения орновнения орновнения орновнения у пациентов, которые уже получают орновнения орновнения орновнения орновнения орновнения у пациентов, которые уже получают орновнения артериального давления, таживариси и ратоми из за содержания в составе препарата ацентисалициповом изистоты; - редисие въследственные состояния и непереносмость таживатоды, ефециал пактама им истидую мальабосрофия головоз-галанства и за содержания в составе препарата пастигия с предоставленность и период гружного въсхраживатом и предоставления кровогечения (по данным испедования АСПУ-6 частота разватия нальженений была кочень часто), короногечения была кочень часто), короногечения была кочень часто), короногечения в месте дового пределений поряжений и поста объекты в пределений поряжений поряже гликопротенна III/IIIа, гепарином, непрямыми антикоатулянтами, нестроидными противовоспалительными преларатами, селективными ингибиторами обратного захвата серотоника. Особые указаний в С вязых риском равлития кроменном размити компомов, подозригельных на возникновение кровотечения, подученном подозригельных на возникновение кровотечения, следует срочно сделать общий клинический анализ крови, определить активированное частичное громбогластиновее время (АЧТВ), компчество тромбогитов, показаний одначений клинический анализ крови, определить активированное частичное громбогластиновее время (АЧТВ), компчество тромбогитов, подозригельных на возвикновение частичное громбогластиновее время (АЧТВ), компчество тромбогитов, подозригельных распедательных сарамет в анализительных распедательных пределательных предел