

Подагра. Информация для пациентов.

Сывороточную концентрацию
мочевой кислоты следует
поддерживать
на уровне
ниже 6 мг/дл
(360 мкмоль/л)
на протяжении
всей жизни¹



ЭТО ОДИН ИЗ
ВАЖНЫХ ШАГОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ
ПОДАГРЫ!

podagra.pro 



При поддержке



Что такое подагра?

Каковы факторы риска?

Причины подагры

Как проявляется подагра?

Как подагра влияет на организм?

Какие исследования позволяют диагностировать заболевание?

Как следует изменить питание?

Как лечить подагру?

Что делать при остром приступе?

ОТВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, ДИЕТУ, А ТАКЖЕ ВИКТОРИНУ ПО ПОДАГРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ

podagra.pro



1. Richette, P., et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–14 [Epub ahead of print]

 **БЕРЛИН-ХЕМИ
МЕНАРИНИ**

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10,
БЦ «Башня на Набережной», блок Б.
Тел.: (495) 785 -01-00, факс: (495) 785-01-01;
www.berlin-chemie.ru

RU-ADE-04-2020_V1_digital 04.2020